

Beclometasona (uso tópico)



Corticoide de uso cutáneo de potencia alta. Actividad antiinflamatoria local. Inhibe las reacciones inflamatorias de la piel, llevando a la remisión de los signos objetivos (eritema, edema e infiltración) y de los síntomas (picor, ardor y dolor).

USO CLÍNICO

En niños mayores de 5 años (A).

Formas agudas de dermatitis de contacto alérgica, dermatitis de contacto irritativa, eccema dishidrótico y eccema vulgar. Dermatitis atópica, neurodermatitis y eccema seborreico. Coadyuvante en el tratamiento de la psoriasis.

La crema y la emulsión cutánea están indicadas, sobre todo, en las formas exudativas, el ungüento está indicado con preferencia en las formas secas.

DOSIS Y PAUTAS DE ADMINISTRACIÓN

Una o dos aplicaciones al día, una vez controlada la lesión, puede reducirse a una vez al día.

La duración del tratamiento no debe exceder de dos semanas, en la cara se recomienda el menor tiempo posible

CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad al principio activo o a los excipientes
- Presencia de procesos tuberculosos o sifilíticos, infecciones víricas como herpes o varicela, rosácea, dermatitis perioral, úlceras, acné vulgar, enfermedades atróficas de la piel y reacciones vacunales en el área a tratar.
- Enfermedad cutánea bacteriana o fúngica (requiere tratamiento adicional específico).

- No debe aplicarse en los ojos ni en heridas profundas abiertas.
- **Niños menores de 1 año.**

PRECAUCIONES

- **Niños menores de 5 años:** No se ha establecido su seguridad y eficacia
- Los corticoides se deben usar en la menor dosis posible y solo durante los tiempos absolutamente necesarios.
- No debe aplicarse en áreas extensas de piel.
- No debe aplicarse en zonas intertriginosas.
- No debe aplicarse bajo oclusión. Debe tenerse en cuenta que los pañales pueden ser oclusivos.
- Los niños tienen mayor susceptibilidad que los adultos a padecer supresión adrenal inducida por corticoides, síndrome de Cushing y aumento de la presión intracraneal, por tener mayor superficie corporal en relación al peso.

EFECTOS SECUNDARIOS

Los efectos adversos del tratamiento con beclometasona tópica son en general efectos locales, leves y transitorios (reversibles). Su acentuación puede ser más frecuente cuando se tratan zonas cutáneas extensas, con grandes cantidades o durante periodos de tiempo prolongados, o si se utilizase oclusión; la absorción también aumenta en las zonas de piel fina y en los pliegues de piel.

Si aparecen los efectos adversos debe suspenderse el tratamiento.

- Hipersensibilidad cutánea.
- Supresión reversible del eje-hipotálamo-hipófisis-adrenal.
- Glaucoma.
- Hipertensión.
- Edema.
- Atrofia cutánea, estrías, sensación de quemazón, prurito, eritema o sequedad en el lugar de la aplicación, telangiectasias, hematoma, acné, erupciones acneiformes, foliculitis, hipertrichosis, dermatitis perioral, infección secundaria e hipopigmentación.

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS

Hasta el momento no se han descrito.

DATOS FARMACÉUTICOS

Crema: alcohol cetílico, alcohol estuárico, propilenglicol, extracto de raíz de *Althaea officinallis*, parafina líquida, alcohol bencílico, ácido esteárico, cetomacrogol 700, sorbitol y agua.

Ungüento: parahidroxibenzoato de metilo (ER-218), lanolina, parafina líquida, parafina filante, extracto de raíz de *Althaleae officinallis* y alcohol etílico.

Emulsión cutánea: alcohol cetílico, alcohol estearílico, propilenglicol, extracto de raíz de *Althaleae officinallis*, parafina líquida, parafina filante, alcohol bencílico, glicerol (E-422), ácido esteárico, cetomacrogol 700, sorbitol, dimeticona, esencia y agua.

Periodo de validez: 5 años.

Presentaciones comerciales. *Las presentaciones disponibles en España pueden consultarse online en el Centro de Información de Medicamentos de la AEMPS (CIMA), <http://www.aemps.gob.es/cima> , y en <http://pediamecum.es> en el enlace **Presentaciones** correspondiente a cada ficha.*

Fecha de actualización: Noviembre 2015.

La información disponible en cada una de las fichas del Pediamécum ha sido revisada por el **Comité de Medicamentos** de la **Asociación Española de Pediatría** y se sustenta en la bibliografía citada. Estas fichas no deben sustituir en ningún caso a las aprobadas para cada medicamento por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (**AEMPS**) o la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Sugerencia para citar esta ficha:

Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría. Pediamécum. Edición 2015. Beclometasona (uso tópico). Disponible en: <http://www.pediamecum.es>. Consultado en (fecha de la consulta).